

菌類日本固有種目録(2016年12月版)

和名	学名	科	Family	分布 *1
チャキツネノカラカサタケ	<i>Lepiota cinnamomea</i> Hongo	ハラタケ科	Agaricaceae	京都・滋賀
キヒダカラカサタケ	<i>Lepiota subcitrifolia</i> Hongo	ハラタケ科	Agaricaceae	京都・滋賀
ナスビタケ (ヌメリアイタケ、ヌメリアキタケ)	<i>Albatrellus yasudae</i> (Lloyd) Pouzar	ニンギョウタケ科	Albatrellaceae	日本
キウロコテングタケ	<i>Amanita alboflavescens</i> Hongo	テングタケ科	Amanitaceae	京都・滋賀・熊本
ササクレシロオニタケ	<i>Amanita eijii</i> Zhu L. Yang	テングタケ科	Amanitaceae	長野・新潟・大阪・鳥取
ドウシントケ	<i>Amanita esculenta</i> Hongo & I. Matsuda	テングタケ科	Amanitaceae	本州～九州
シロオニタケモドキ	<i>Amanita hongoi</i> Bas	テングタケ科	Amanitaceae	滋賀・京都・兵庫・大分
シロテングタケ	<i>Amanita neo-ovoidea</i> Hongo	テングタケ科	Amanitaceae	本州以南
イボコガネテングタケ	<i>Amanita pseudogemmata</i> Hongo	テングタケ科	Amanitaceae	京都・滋賀
コブミノシバフタケ	<i>Panaeolina sagarae</i> Hongo	オキナタケ科	Bolbitiaceae	京都
ナガエノウラベニイグチ	<i>Boletus quercinus</i> Hongo	イグチ科	Boletaceae	本州・九州
ザイモクイグチ	<i>Buchwaldoboletus pseudolignicola</i> (Neda) Both & B. Ortiz	イグチ科	Boletaceae	茨城
ヒビワレニガイグチ	<i>Tylopilus areolatus</i> Hongo	イグチ科	Boletaceae	滋賀
オオムラサキアンズタケ	<i>Cantharellus purpuraceus</i> Iwade	アンズタケ科	Cantharellaceae	日本
コガネフウセンタケモドキ	<i>Cortinarius aurantiofulvus</i> Hongo	フウセンタケ科	Cortinariaceae	滋賀
オオササタケ	<i>Cortinarius cinnamomeoides</i> Hongo	フウセンタケ科	Cortinariaceae	滋賀
トガリニセフウセンタケ	<i>Cortinarius galeroideus</i> Hongo	フウセンタケ科	Cortinariaceae	滋賀
コツバフウセンタケ	<i>Cortinarius neoarmillatus</i> Hongo	フウセンタケ科	Cortinariaceae	兵庫・滋賀
アサクラフウセンタケ	<i>Cortinarius shigaensis</i> Hongo	フウセンタケ科	Cortinariaceae	新潟・滋賀・京都・兵庫
ウスムラサキフウセンタケ	<i>Cortinarius subalboviolaceus</i> Hongo	フウセンタケ科	Cortinariaceae	滋賀・広島
ツバフウセンタケモドキ	<i>Cortinarius subarmillatus</i> Hongo	フウセンタケ科	Cortinariaceae	京都・兵庫・鳥取
マルミノアブラシメジ	<i>Cortinarius subdelibutus</i> Hongo	フウセンタケ科	Cortinariaceae	滋賀・兵庫
ワタムキツバフウセンタケ	<i>Cortinarius watamukiensis</i> Hongo	フウセンタケ科	Cortinariaceae	滋賀
アカヒダワカフサタケ	<i>Hebeloma vinosophyllum</i> Hongo	フウセンタケ科	Cortinariaceae	日本
マンネンハリタケ	<i>Echinodontium tsugicola</i> (Henn. & Shirai) Imazeki	マンネンハリタケ科	Echinodontiaceae	日光・赤城・秩父・信州：八ヶ岳など
コウボウフデ (コウボウフデタケ)	<i>Pseudotulostoma japonicum</i> (Kawam. ex Otani) I. Asai, H. Sato & Nara	ツチダンゴ科	Elaphomycetaceae	熊本・京都・滋賀・愛知・栃木・茨城・福島など
クロウラベニタケ	<i>Clitopilus lignyotus</i> Hongo	イッポンシメジ科	Entolomataceae	滋賀
ヒメシロウラベニタケ	<i>Entoloma chamaecyparidis</i> (Hongo) Hongo	イッポンシメジ科	Entolomataceae	滋賀・鳥取
コンイロイッポンシメジ	<i>Entoloma cyanonigrum</i> (Hongo) Hongo	イッポンシメジ科	Entolomataceae	日本
アイイッポンシメジ	<i>Entoloma glutiniceps</i> (Hongo) Noordel. & Co-	イッポンシメジ科	Entolomataceae	小笠原諸島父島
キヒダイッポンシメジ	<i>Entoloma kansaiense</i> (Hongo) Noordel. & Co-	イッポンシメジ科	Entolomataceae	滋賀・京都
エイザンモミウラモドキ	<i>Entoloma mycenoides</i> (Hongo) Hongo	イッポンシメジ科	Entolomataceae	滋賀・京都
エビイロタケ (エビタケ)	<i>Ganoderma tsunodae</i> Yasuda	マンネンタケ科	Ganodermataceae	日本
シロアンズタケ	<i>Gloeocantharellus pallidus</i> (Yasuda) Giachini	ラッパタケ科	Gomphaceae	北海道・本州・四国
クロキツネタケ	<i>Laccaria nigra</i> Hongo	ヒドナンギウム科	Hydnangiaceae	滋賀
コベニヤマタケ	<i>Hygrocybe imazekii</i> Hongo	ヌメリガサ科	Hygrophoraceae	本州・九州
トガリワカクサタケ (カワリワカクサタケ)	<i>Hygrocybe olivaceoviridis</i> (Hongo) Hongo	ヌメリガサ科	Hygrophoraceae	滋賀・香川
フタイロヒメノカサ	<i>Hygrocybe otsuensis</i> (Hongo) Hongo	ヌメリガサ科	Hygrophoraceae	本州
シロヒガサ	<i>Hygrocybe pantoleuca</i> (Hongo) Hongo	ヌメリガサ科	Hygrophoraceae	滋賀
ヌマキヤマタケ	<i>Hygrocybe stagnina</i> Hongo	ヌメリガサ科	Hygrophoraceae	滋賀
トガリダイダイタケ	<i>Hygrocybe subacuta</i> (Hongo) Hongo	ヌメリガサ科	Hygrophoraceae	小笠原諸島父島
ヤマヒガサタケ	<i>Hygrocybe subcinnabarina</i> (Hongo) Hongo	ヌメリガサ科	Hygrophoraceae	滋賀・京都

菌類日本固有種目録 (2016年12月版)

和名	学名	科	Family	分布 *1
シュイロガサ	<i>Hygrocybe suzukaensis</i> (Hongo) Hongo	ヌメリガサ科	Hygrophoraceae	滋賀・京都
ウバノカサモドキ	<i>Hygrophorus lilacinogriseus</i> Hongo	ヌメリガサ科	Hygrophoraceae	滋賀・埼玉
フユヤマタケ	<i>Hygrophorus pinetorum</i> Hongo	ヌメリガサ科	Hygrophoraceae	本州・九州
ツヤナシマンネンタケ	<i>Pyrrhoderma sendaiense</i> (Yasuda) Imazeki	タバコウロコタケ科	Hymenochaetaceae	宮城・新潟・神奈川・大分
サザレイシタケ	<i>Hymenogaster pacificus</i> Kobayasi	ヒメノガステル科	Hymenogasteraceae	東京・京都
バライロチャヒラタケ	<i>Crepidotus boninensis</i> (Hongo) E. Horak &	アセタケ科	Inocybaceae	小笠原諸島母島
ザラミノチャヒラタケ	<i>Crepidotus longistriatus</i> S. Imai	アセタケ科	Inocybaceae	北海道
オガサワラチャヒラタケ	<i>Crepidotus palmularis</i> (Berk. & M.A. Curtis)	アセタケ科	Inocybaceae	小笠原諸島父島・母島
ムラサキチャヒラタケ	<i>Crepidotus subpurpureus</i> S. Ito & S. Imai	アセタケ科	Inocybaceae	小笠原諸島母島
ツチチャヒラタケ	<i>Crepidotus terrestris</i> S. Imai	アセタケ科	Inocybaceae	北海道
イロガワリチャアセタケ	<i>Inocybe quercina</i> Hongo	アセタケ科	Inocybaceae	滋賀
ツボアセタケ	<i>Inocybe subvolvata</i> Hongo	アセタケ科	Inocybaceae	滋賀
ムニンチヂミタケ	<i>Campanella boninensis</i> (S. Ito & S. Imai)	ハウライタケ科	Marasmiaceae	小笠原諸島
カバイロオオハウライタケ	<i>Marasmius aurantioferrugineus</i> Hongo	ハウライタケ科	Marasmiaceae	本州
ムニンチャダイゴケ	<i>Cyathus boninensis</i> S. Ito & S. Imai	チャダイゴケ科	Nidulariaceae	小笠原諸島
アカヒトデタケ	<i>Aseroë coccinea</i> Imazeki & Yoshimi ex Kasuya	スッポンタケ科	Phallaceae	広島・栃木
ササナバ	<i>Ramaria campestris</i> (K. Yokoy. & Sagara) R.H.	ホウキタケ科	Ramariaceae	九州
ヒメシロチチタケ	<i>Lactifluus uyedae</i> (Singer) Verbeken	ベニタケ科	Russulaceae	滋賀・京都・大阪
クリイロイチメガサ	<i>Kuehneromyces castaneus</i> Hongo	モエギタケ科	Strophariaceae	滋賀
ニガクリタケモドキ	<i>Naematoloma gracile</i> Hongo	モエギタケ科	Strophariaceae	滋賀
アイセンボンタケ	<i>Psilocybe fasciata</i> Hongo	モエギタケ科	Strophariaceae	本州
アイゾメシバフタケ (ヒカゲシビレタケ)	<i>Psilocybe subcaerulipes</i> Hongo	モエギタケ科	Strophariaceae	本州
ハチマキイヌシメジ	<i>Clitocybe vittatipes</i> S. Ito & S. Imai	キシメジ科	Tricholomataceae	小笠原諸島母島
シワカラカサモドキ	<i>Cystoderma neoamianthinum</i> Hongo	キシメジ科	Tricholomataceae	兵庫・奈良
チチシマシメジ	<i>Porpoloma boninense</i> (S. Ito & S. Imai) Hongo	キシメジ科	Tricholomataceae	小笠原諸島
ニセマツタケ	<i>Tricholoma fulvocastaneum</i> Hongo	キシメジ科	Tricholomataceae	本州・四国・九州, 徳之島まで, 沖縄は未確認
ヤブアカゲシメジ	<i>Tricholomopsis bambusina</i> Hongo	キシメジ科	Tricholomataceae	本州
ヒメチシオシメジ	<i>Tricholomopsis sanguinea</i> Hongo	キシメジ科	Tricholomataceae	京都・奈良・大阪・徳島
ササアカゲタケ	<i>Tricholomopsis sasae</i> Hongo	キシメジ科	Tricholomataceae	本州・小笠原諸島

*1 今関六也・本郷次雄, 1985, 1987. 原色日本新菌類図鑑 (I) (II). 保育社 に基づく分布情報。